ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № 20070216
Разрешение № BG/MA/MP-4295
Одобрение № 27 -09- 2018

Листовка: информация за пациента

МАКМИРОР 200 mg обвити таблетки
MACMIROR 200 mg coated tablets
Нифурател (Nifuratel)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежеланите лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява МАКМИРОР и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете МАКМИРОР
3. Как да приемате МАКМИРОР
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате МАКМИРОР
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява МАКМИРОР и за какво се използва

МАКМИРОР съдържа активното вещество нифурател. Нифурател принадлежи към групата на гинекологичните антиинфекциозни средства и антисептици с изключение на комбинации с кортикостероиди, като притежава антитрихомоназно, антимикотично (противогъбично) и антибактериално действие.

МАКМИРОР е показан при:
- Вулвовагинални инфекции и бяло течение, предизвикано от патогенни микроорганизми: бактерии, трихомонас, монилия, мицети.
- Инфекции на пикочните пътища.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете МАКМИРОР

Не приемайте МАКМИРОР
- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете МАКМИРОР.
По време на лечението трябва да се избягват половите контакти.
Когато се използва за лечение на вулвовагинални инфекции, партньорът също трябва да бъде подложен на системна терапия с МАКМИРОР.
Продуктът не се препоръчва при деца на възраст под 6 години.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ •

Други лекарства и МАКМИРОР
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

МАКМИРОР с храна и алкохол
По време на лечението трябва да се избягва консумацията на алкохол, който може да предизвика зачервяване в областта на лицето и шията, както и чувство на прилошаване и гадене, отзвучаващи спонтанно.
Едновременната употреба с алкохол може да предизвика дисулфирам-подобна реакция (зачервяване, горещи вълни, повръщане и учестяване на сърдечната дейност).

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
МАКМИРОР може да се прилага под лекарски контрол по време на бременност и кърмене само ако Вашият лекар прецени, че употребата е абсолютно необходима.

Шофиране и работа с машини
МАКМИРОР не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

МАКМИРОР съдържа захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате МАКМИРОР

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза при вагинални инфекции е:
Възрастни: по 1 обвита таблетка 3 пъти дневно, след хранене, в продължение на 1 седмица за жената и нейния партньор/и.
Лечението се допълва с: 1 вагинална капсула или 2-3 g крем вечер преди лягане за 10 дни.
Пациентите, които се лекуват само чрез перорално приложение трябва да приемат по 1 обвита таблетка 4 пъти дневно.

Препоръчителната доза при инфекции на уринарния тракт е:
Възрастни: 1-2 обвити таблетки 3 пъти дневно, , като в зависимост от причинителя и тежестта на инфекцията средната продължителност на лечението е от 1до 2 седмици.
По лекарска препоръка курсът на лечение с нифурател при инфекции на уринарния тракт може без опасност за пациента да бъде удължен или повторен.

Начин на приложение
Лекарството трябва винаги да се приема през устата, след хранене, с голямо количество течност и да не се сдъвква.

Ако сте приели повече от необходимата доза МАКМИРОР
Уведомете Вашия лекар, ако сте приели повече от необходимите таблетки. Вашият лекар ще предприеме най-добрите възможни мерки при предозиране.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ •

Ако сте пропуснали да приемете МАКМИРОР
Уведомете Вашия лекар, ако сте пропуснали една или повече дози.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, макар че не всеки ги получава.

При приложението на МАКМИРОР са наблюдавани следните нежелани реакции:
Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):
- гадене

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):
- повръщане, диспепсия
- реакции на свръхчувствителност (като кожен обрив, уртикария или локален оток)

С неизвестна честота (не могат да се определят от наличните данни):
- Различни други видове кожен обрив

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев" № 8 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате МАКМИРОР

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°C.
Да се съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа МАКМИРОР
Активното вещество е: Нифурател (Nifuratel) 200 mg
Другите съставки са:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ •

Ядро на на таблетката: царевично нишесте, талк, магнезиев стеарат, полиетилен гликол 6 000
Обвивка на таблетката: оризово нишесте, магнезиев карбонат, желатин, захароза, титанов диоксид, арабска гума, восък

Как изглежда МАКМИРОР и какво съдържа опаковката
МАКМИРОР 200 mg обвити таблетки са опаковани в блистери и се предлагат в картонени кутии, съдържащи 20 обвити таблетки и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба
POLICHEM S.A.
50 Val Fleuri
L-1526 Люксембург

Производител
Doppel Farmaceutici S.R.L.
Via Volturno 48, Quinto De' Stampi
20089 Rozzano, Milano, Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Анджелини Фарма България ЕООД
Бул. „Асен Йорданов" 10
София 1592, България
Тел: + 359 2 975 13 95
Факс: +359 2 971 57 45

Дата на последно преразглеждане на листовката 08/2018.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ •